

PROTOCOLO DE MEDICAÇÕES EM BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

PROTOCOLO BLOQUEIO NEUROMUSCULAR CONTÍNUO - **PANCURÔNIO** – BIC (ampola de 2mg/mL)

BOLUS: 0,06-0,1mg/kg (DA SOLUÇÃO DE INFUSÃO)

INFUSÃO: 20mL (equivalente a 40mg) + 80mL de SF 0,9% = 0,4MG/ML = DOSE 0,048-0,102 MG/KG/H

PESO	50KG	55KG	60KG	65KG	70KG	75KG	80KG	85KG	90KG	95KG	100KG
BOLUS (mL)	10mL	12mL	14mL	15mL	16mL	18mL	20mL	20mL	22mL	22mL	25mL
DOSE INICIAL	6mL/h	6,5mL/h	7mL/h	7,5mL/h	8,5mL/h	9mL	9,5mL/h	10mL/h	10,5mL/h	11mL/h	12mL/h
ALTERAR	0,5mL	0,5ml	0,5ml	0,5ml	0,5ml	0,5ml	0,5ml	0,5ml	0,5ml	0,5ml	0,5ml
DOSE MAXIMA	13mL/h	14mL/h	15mL/h	17mL/h	18mL/h	19mL/h	21mL/h	22mL/h	23mL/h	24mL/h	26mL/h

Para intubação: utilizar a mesma dose em bolus descrita acima, só que da solução pura. Tem início de ação em 3-5 minutos após administração, portanto administrar no momento de início da pré-oxigenação.

PROTOCOLO BLOQUEIO NEUROMUSCULAR CONTÍNUO - **ATACÚRIO** – BIC (ampola de 10mg/mL)

BOLUS: 0,4-0,5mg/kg (puro)

INFUSÃO: 20mL (equivalente a 200mg) + 80mL de SF 0,9% = 2MG/ML = DOSE 0,24-1,2 MG/KG/H

PESO	50KG	55KG	60KG	65KG	70KG	75KG	80KG	85KG	90KG	95KG	100KG
BOLUS (mL)	25mL	28mL	30mL	33mL	35mL	38mL	40mL	43mL	45mL	48mL	50mL
DOSE INICIAL	6mL/h	7mL/h	7mL/h	8mL/h	9mL/h	9mL	10mL/h	10mL/h	11mL/h	11mL/h	12mL/h
ALTERAR	5mL										
DOSE MAXIMA	30mL/h	35mL/h	35mL/h	40mL/h	45mL/h	45mL/h	50mL/h	50mL/h	55mL/h	55mL/h	60mL/h

Para intubação: utilizar a mesma dose em bolus descrita acima. Tem início de ação em 2-3 minutos após administração.

PROTOCOLO DE MEDICAÇÕES EM BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

PROTOCOLO SEDAÇÃO CONTÍNUA COM **MIDAZOLAM** – BIC (ampola de 5mg/mL)

BOLUS: 0,01- 0,05mg/kg

INFUSÃO: 20mL (equivale a 100mg) + 80mL de SF0,9% = 1MG/ML = DOSE 0,02- 0,1 MG/KG/H

PESO	50KG	55KG	60KG	65KG	70KG	75KG	80KG	85KG	90KG	95KG	100KG
BOLUS (mL)	0,5-2,5	0,5-3	0,5-3	1-3	1-3,5	1-4	1-4	1-4	1-4,5	1-5	1-5mL
DOSE INICIAL	1mL/h	1mL/h	1mL/h	1mL/h	1mL/h	2mL/h	2mL/h	2mL/h	2mL/h	2mL/h	2mL/h
ALTERAR	0,5mL	0,5ml	0,5ml	0,5ml	0,5ml	0,5ml	0,5ml	0,5ml	0,5ml	0,5ml	0,5ml
MÁXIMO	5mL/h	7mL/h	6mL/h	7mL/h	7mL/h	8mL/h	8mL/h	9mL/h	9mL/h	10mL/h	10mL/h

PROTOCOLO ANALGESIA CONTÍNUA COM **FENTANIL** – BIC (ampola de 50mcg/mL)

BOLUS: 0,5- 2mcg/kg

INFUSÃO: 20 mL (equivale a 1000mcg) + 80mL de SF 0,9% = 10MCG/ML = DOSE 0,7- 1 MCG/KG/H

PESO	50KG	55KG	60KG	65KG	70KG	75KG	80KG	85KG	90KG	95KG	100KG
BOLUS	0,5-2mL	1-2mL	1-3mL	1-3mL	1-3mL	1-3mL	1-3mL	1-4mL	1-4mL	1-4mL	1-4mL
DOSE INICIAL	4mL/h	4mL/h	4mL/h	4 mL/h	5 mL/h	5 mL/h	6 mL/h	6 mL/h	7mL/h	7mL/h	7 mL/h
ALTERAR	0,5mL	0,5ml	0,5ml	0,5ml	0,5ml	0,5ml	0,5ml	0,5ml	0,5ml	0,5ml	0,5ml
DOSE MAXIMA	5mL/h	6mL/h	6mL/h	7mL/h	7mL/h	8mL/h	8mL/h	9mL/h	9mL/h	10mL/h	11mL/h

PROTOCOLO ANALGESIA CONTÍNUA COM **MORFINA** – BIC (ampola de 10mg/mL)

BOLUS: 2-10mg

INFUSÃO: 10 mL (equivale a 100mg) + 90mL de SF 0,9% = 1MG/ML = DOSE 0,07-0,5MG/KG/H

PESO	50KG	55KG	60KG	65KG	70KG	75KG	80KG	85KG	90KG	95KG	100KG
BOLUS	2-10mL										
DOSE INICIAL	4mL/h	4mL/h	4mL/h	4 mL/h	5 mL/h	5 mL/h	6 mL/h	6 mL/h	7mL/h	7mL/h	7 mL/h
ALTERAR	5mL										
DOSE MAXIMA	25mL/h	30mL/h	30mL/h	35mL/h	35mL/h	40mL/h	40mL/h	45mL/h	45mL/h	50mL/h	50mL/h

PROTOCOLO DE MEDICAÇÕES EM BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

PROTOCOLO NORADRENALINA – BIC (ampola de 8mg/4mL, com 4mg/4mL de noradrenalina base [efetiva])											
INFUSÃO: 20mL (equivale a 05 ampolas) + 80ML SG 5% = 200MCG/ML= DOSE 0,01-2MCG/KG/MIN											
PESO	50KG	55KG	60KG	65KG	70KG	75KG	80KG	85KG	90KG	95KG	100KG
DOSE INICIAL	5mL/h	5mL/h	5mL/h	5mL/h	5mL/h	5mL/h	5mL/h	5mL/h	5mL/h	5mL/h	5mL/h
ALTERAR	0,5mL	0,5ml	0,5ml	0,5ml	0,5ml	0,5ml	0,5ml	0,5ml	0,5ml	0,5ml	0,5ml
DOSE MAXIMA	30mL/h	33mL/h	36mL/h	39mL/h	42 mL/h	45mL/h	48mL/h	51mL/h	54mL/h	57 mL/h	60mL/h

Obs: a dose inicial poderá ser maior ou menor, a critério do médico assistente, dependendo da gravidade da hipotensão.